

Toute personne ayant porté secours à ce patient (témoin, membre de la famille, ami, médecin, service d'urgence...) doit impérativement informer le professionnel ayant délivré ce kit :

Nom du professionnel : _____

Qualité (médecin, pharmacien...) : _____

Téléphone : _____

E-Mail : _____

Pour toute information complémentaire relative à l'utilisation de PRENOXAD, veuillez consulter le site www.prenoxad.fr

Nom du patient : _____

Je porte sur un moi un kit PRENOXAD[®], une seringue pré-remplie contenant de la naloxone, indiqué chez l'adulte dans le traitement d'urgence des surdosages aux opioïdes. La naloxone est un antagoniste des récepteurs opioïdes.

Ce médicament peut me sauver la vie en cas de surdosage aux opioïdes.

Toute personne (ami, famille, témoin) est en mesure de m'administrer ce médicament selon le schéma figurant dans la notice.

- **Avant toute utilisation de PRENOXAD[®], appeler le service d'urgence en composant le 15 ou le 112.**
- Administrer une dose de PRENOXAD[®] (indiquée par une ligne noire sur la seringue), en injectant le produit au niveau du muscle extérieur de la cuisse ou du haut du bras.
- Après 2 à 3 minutes, en absence d'amélioration de la respiration ou de l'état d'éveil, répéter l'administration de PRENOXAD[®] (une nouvelle ligne noire).
- Répéter l'opération autant de fois que nécessaire le temps de l'arrivée des secours ou le temps de la reprise de conscience.

Il est important de prévenir le professionnel qui m'a remis ce kit Prenoxad[®]. Ses coordonnées sont au verso de cette carte.